



Rapaces tombés du nid



Chouette de Tengmalm

Rapace nocturne, se reconnaît aux yeux situés sur la face.

L'oisillon quitte son nid pour apprendre à voler. Les parents sont toujours dans les parages pour le surveiller et le nourrir.

Intervenir uniquement si l'oisillon est blessé (sang, aile cassée...).

Faucon hobereau

Rapace diurne, se reconnaît aux yeux situés de côté, par un bec crochu et par ses puissantes serres.

L'oisillon est condamné car les parents ne peuvent pas intervenir pour la survie de leur progéniture.

Il est impératif d'intervenir...



Confiez cette tâche à un spécialiste. En suivant scrupuleusement les cinq points ci-dessous, vous leur donnerez toutes les chances de survie.

1. Mettez des gants et enveloppez l'oisillon dans un linge (sans serrer). **2.** Placez-le dans un carton percé de trous dans lequel vous aurez mis du papier ménager, et installez-le dans un local calme, sombre et tempéré. **3.** Téléphonez immédiatement au COR (079 624 33 07 – 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi). Un spécialiste vous dictera la marche à suivre. **4.** Evitez toute manipulation, car cela provoquerait un stress qui aggraverait son état (le stress peut provoquer la mort !). **5.** Ne donnez ni à boire, ni à manger, ni médicaments.

Important

Contrairement à l'idée reçue, les oiseaux sont totalement insensibles aux odeurs humaines.

N'hésitez pas et renseignez-vous auprès de notre Service d'études et de protection, tél. **079 624 33 07** (lundi/vendredi de 8h00 à 18h00)

Centre Ornithologique de Réadaptation, ch. des Chênes 47, 1294 Genthod
www.cor-ge.org